

Andreas Huber¹

Neue Verordnung des Bundes

Um eine COVID-19-Infektion festzustellen, können zusätzlich zu den bereits angewendeten Tests (PCR-Tests) seit dem 2. November 2020 auch Antigen-Schnelltests eingesetzt werden. Dies ermöglicht eine breitere und schnellere Testung der Bevölkerung. Es können mehr positive Fälle in der Bevölkerung rasch nachgewiesen und isoliert werden.

Die Genauigkeit der Schnelltests wurde durch das «Centre national de Référence pour Infections Virales Emergentes» (CRIVE) in Genf evaluiert. Die Schnelltests sind im Vergleich zu den PCR-Testen weniger emp-

findlich. Sie sind vor allem dann einsetzbar, wenn eine Person infektiös ist. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) sieht daher den Einsatz dieser Schnelltests nur bei denjenigen Personen vor, die gemäss den Kriterien des BAG als symptomatisch gelten und nicht zu den besonders gefährdeten Personen gehören. Zudem sollte das Auftreten der Symptome weniger als vier Tage her sein. Auch bei asymptomatischen Personen, die eine Meldung der Swiss Covid App erhalten haben, ist der Einsatz dieser Schnelltests möglich. Alle Personen, die mittels eines Schnelltests positiv getestet wurden, sollten sich dennoch umgehend in Isolation begeben.

Die Schnelltests werden vom Bund

vergütet – allerdings ausschliesslich für diejenigen Personen, auf welche die Empfehlungen des BAG zutreffen.

COVID-19-Verordnung 3 (Schnelltests)

www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/63488.pdf

Quelle

www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-80882.html

Korrespondenz

andreas.huber@ufli.li

¹ Prof. Dr. med. Andreas Huber, Private Universität im Fürstentum Liechtenstein

Andreas Huber¹

Nouvelle ordonnance

A partir du 2 novembre 2020, il est possible d'utiliser, en plus des tests PCR, les tests rapides antigéniques pour déterminer si une personne est infectée par le COVID-19. L'objectif est de permettre un dépistage plus vaste et plus rapide de la population, soit concrètement de détecter et d'isoler plus rapidement davantage de cas positifs.

Le Centre national de référence pour les infections virales émergentes (CRIVE), sis à Genève, a évalué la fiabilité de ces tests, qui sont moins sensibles que les tests PCR. Comme ils sont surtout indiqués lorsque les per-

sonnes sont contagieuses, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) prévoit de les utiliser uniquement pour les personnes qu'il considère comme symptomatiques et qui ne font pas partie des groupes vulnérables. A noter que l'apparition des symptômes doit remonter à moins de quatre jours. L'utilisation des tests rapides est aussi possible pour des personnes certes asymptomatiques, mais qui ont reçu une notification de l'application Swiss-Covid, tout en se plaçant immédiatement en isolement.

Les tests rapides sont remboursés par la Confédération, mais uniquement lorsqu'ils ont été utilisés conformément aux recommandations de l'OFSP.

Ordonnance 3 COVID-19 (Tests rapides de l'antigène SARS-CoV-2)

www.news.admin.ch/newsd/message/attachments/63490.pdf

Source

www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-80882.html

Correspondance

andreas.huber@ufli.li

¹ Prof. Dr. méd. Andreas Huber, Université privée du Liechtenstein